

# Книга

## Слишком грубые ошибки

Ф. Н. Шепетов «Чесотка овец». СНХГ, 1931 г., стр. 32, ц. 18 коп.

Книжка видимо предназначена для массового читателя из среды работников овцеводческих совхозов и колхозов.

Между тем она страдает серьезными погрешностями.

Автор в отдельных местах обнаруживает слабое знакомство со способами противочесоточной обработки овец в крупных хозяйствах.

Так автор уверяет, что нельзя погружать голову овцы в ванну, тогда как каждый чабан знает, что овцы при купании окунаются с головой. Непонятно, почему можно купать ягнят с материами не более 10 голов в купке. Двенадцатичасовое голодание овец перед купанием слишком длительно, достаточно восьми часов.

Рекомендуемый автором способ обсушивания овец на специальной подставке (рис. 9) применят при лечении 2—3 овец, но для крупных социалистических хозяйств с десятками тысяч голов он конечно не годится. Обычно овцы из ванны выходят на площадку (специальный сток), откуда поступают не в базок, а в крытый сарай.

Рисунки 7 и 8, характеризующие рекомендуемый автором способ купания овец, имеют в виду повидимому лишь единоличника, владеющего полдюжины овец.

Для крупного советского овцеводческого хозяйства этот способ конечно также никуда не годится.

Дальше, произведя расчет рабочей силы при купании овец в 8-метровой ванне, автор обещает выкупать за 8 часов 1 000—1 200 голов, при выдержке овцы в ванне в течение трех минут.

Посчитаем. Одновременно в ванне может находиться максимум 5 овец. В один час следовательно можно выкупать 100 голов, в 8 часов — 800 голов. Если из этих 8 часов вычесть хотя бы час для вливания жидкости в ванну, то 700 голов — максимальная цифра.

Между тем в совхозах Овцевода не без успеха купают за 10-часовой рабочий день 2 500—3 000 голов, но расстановка рабочей силы там далеко не такова, какую предлагает т. Шепетов.

Указанный автором расход купочного раствора в 14 литров на нестриженую и 10 литров на стриженую овцу преувеличен, в действительности расход меньше.

При описании приготовления серно-известковой ванны у автора получилась путаница: «смесь после кипячения отстаивается в ванне; светлая жидкость куда-то отливается и ванна доливается 350—500 л теплой воды с тем, чтобы температура раствора получилась 35—40 градусов».

По Шепетову, 250 л воды вмещается в 5 ведер, тогда как ведро вмещает 10—12 л (стр. 30).

Таких, мягко выражаясь, «неточностей» ошибок у автора можно найти немало.

Так на странице 14, сравнивая живучесть накожников и кожеедов вне организма овцы, автор говорит, что «накожники могут жить до 6 недель. Кожееды еще живущие, они могут жить до 40 дней».

Почему автор решил, что 6 недель короче, чем 40 дней?

Автор не разъясняет, почему зараженные пастбища, тырла базы, дороги должны быть недоступны для здоровых овец 2—4 месяца, если клещи вне овцы живут 40 дней.

Все эти неточности и ошибки снижают ценность нужной по существу книжки.

Ветвра

## Полезная книжка

Шагатин и Пурлевский «Кормление и уход за матками и ягнятами» СНХГ, 1931 г., стр. 51, ц. 25 коп., тир. 50 000 экз.

Брошюра, рассчитанная на массового читателя из среды чабанского состава совхозов и колхозов. Она рассказывает простым, понятным языком об одном из важнейших моментов овцеводческого дела — кормлении и уходе за матками и ягнятами, моменте, имеющем колossalное значение в деле увеличения выхода продукции овцеводства и повышения ее качества.

Наряду с несомненными достоинствами в брошюре имеются некоторые проблемы. Так например силос имеет крупнейшее значение в деле

повышения кормовых ресурсов страны, выделяясь в самые экстенсивные районы, между тем в брошюре ничего не сказано о скармливании силоса (нормах, времени и т. д.).

По вопросу об оплате труда авторы ограничиваются общими фразами и не указывают конкретных форм оплаты.

Нет указаний по производственным нормативам выхода ягнят.

По вопросу о кормлении необходимо указать не только скармливание кормов в абсолютных цифрах, но и указать крахмалы эквиваленты.

Я. Бусури