

Член правления Союзмолоко Т. Гассан Али-  
Омер — инициатор организации промышлен-  
ной переработки овечьего молока в СССР



#### Подготовка маток к дойке

Ягнят, достигших 40—50-дневного возраста по вечерам отбивают от маток и держат отдельно. Утром маток пропускают через доильный станок, выдаивают и пускают с ягнятами на пастбище до вечера, так делается 8—10 дней подряд. Это в дальнейшем способствует окончательной отливке ягнят от маток и приучает ягнят добывать себе подложный корм и кроме того матки легче и спокойнее приучаются к дойке.

В тех районах, где ягната режутся через несколько дней после рождения (для смушки) маток начинают лоить сейчас же, как отнимут ягненка. Овцы, которые теряют своих ягнят (падеж), также начинают лоить без предварительной подготовки.

В тех районах, где отсутствуют солончаковые пастбища, там вблизи доильных станков рекомендуется держать куски (брюски) соли для того, чтобы овцы при выходе из загона (струнга) лизали эту соль, что способствует выделению молока, вызывает большую потребность сочного корма и воды, создавая этим самым бодрое состояние и выносливость овец во время лактационного периода.

#### Установка загона и доильного станка (струнги)

Устройство загонов со струнгой необходимо для того, чтобы овцы спокойно стояли во время дойки.

Доильный станок необходимо держать в чистоте и после дойки обязательно пометать (рис. 1).

Расчет загонов ведется по числу овец так, чтобы на каждую пару овец приходился бы один квадратный метр площади.

## КАК ДОИТЬ ОВЕЦ

Загон имеет два отверстия для выпуска и выпуска овец после дойки. Внутри загона устраиваются струнги, приспособленные для дойки овец, которые состоят из стоек и перегородки с дверьми. Двери имеют 8 верш. ширины, 15 верш. высоты. В эти двери проходят овцы к доярам. На одного дояра приходится от 130 до 150 овец при 2-часовой дойке. Во время дойки овцы должны находиться под павесом для защиты от солнца.




Рис. 1. Общий вид доильного станка

#### Техника доения овец

Перед дойкой овцы осматриваются, причем обращается внимание: на состояние вымени (отсутствие мастита), нет ли червей на овце, не слишком ли разрослись копыта, стесняющие движение овец, нет ли болезненного разрещения рогов и вообще на состояние здоровья овец. При наличии болезни принимаются чабанами меры к устранению болезни.

Все больные овцы немедленно изолируются, а в случае обнаружения эпидемии об этом сейчас же сообщается ветеринарному пункту.

Дояры во время дойки должны держать овец за ноги, а не за шерсть. Дояры перед дойкой



Рис. 2. Дойна овец

должны мыть руки мылом, одевать прозодежду и только после этого приступать к дойке. Для помощи во время дойки дояры должны садиться так, чтобы опытные находились рядом с неопытными.

У овец обязательно выдаивают все молоко и если какая-либо овца сорвется со стонка, ее обязательно возвращают на станок и додаивают (предупреждение мастита). Во время дойки дояры учитывают естественные потребности овец и при характерном вытягивании спины удаляют свой подойник, чтобы не загрязнить молоко. Дояры должны коротко стричь свои ногти, чтобы не поцарапать сосков или вымени овцы. При дойке необходимо всегда иметь при себе чистое полотенце, одна половина которого мокрая, другая сухая для обтирания вымени овец (рис. 2 и 3).



Рис. 3. Общий вид дояра во время доения овцы

Первый прием дойки: первые 2—3 струйки каждого соска сдаиваются двумя пальцами в подойник (рис. 4).

Второй прием дойки: дояр обхватывает обеими руками вымя по всей поверхности и, слегка сжимая его, сдавливает молоко в подойник (рис. 5).



Рис. 4. Первый прием дойки



Рис. 5. Второй прием

Третий прием дойки: повторяется дойка сосков. Во время дойки дояр одной рукой держит овцу, а другой поочередно сжимает и оттягивает пальцами сосок; сделав это 2—3 раза, он переходит к сдавливанию таким же образом другого соска (рис. 6). Если он замечает, что в вымени остается еще молоко, дойка повторяется. При массовой дойке пальцы дояра обычно загрязняются и их необходимо вытирать о влажную половину полотенца. Дояры следят, чтобы выдоенные овцы не имели бы влажного вымени, так как оно легко обветривается и на нем получаются трещины. В процессе дойки молоко из подойника процеживается во фляги через металлическую цедилку с двойным решетом и ватным фильтром (рис. 8).



**Рис. 6. Третий прием**

После окончания дойки фляги с молоком отправляются немедленно на завод. Расстояние от места удоя до завода не должно превышать 7 километров, при хороших перевозочных средствах и дороге, путь следования может быть до 10 километров.

Прозодежда, посуда, подойник и цедилка обязательно содержатся в чистоте. Для чего посуда, подойники, цедилки моются после каждого удоя. Сперва посуду моют холодной водой для удаления белков, потом моют горячей водой с добавлением 2 чайных ложек соды на литр горячей воды, после этого посуда вывешивается на колышки дном вверх. Прозодежда стирается один раз в пятидневку. Полотенца стираются ежедневно.

Дойка производится: утренняя при дневном выпасе, с 3 час. утра до 5 час., а вечерняя с 4½ до 6½ час. вечера; при пастьбе в ночное время с 2 час. утра, до 4 час. утра, вторая дойка днем с 2 час. до 4 час. В зависимости от местных условий и характера хозяйства сроки доения несколько изменяются. Дойка не должна быть дольше 2 час., а поэтому на агару в 1 200 овец требуется 8 дойцов и 3 струнгара. Дойка овцы опытным


дояром продолжается 45—48 секунд. При спешной дойке овец малоопытными доярами наблюдаются случаи запускания овец вследствие неполного сдавивания. Это понижает удои и вызывает воспаление вымени (мастит). Поэтому необходимо добиваться быстрой и полной дойки овец.

#### **Устройство навесов для отбитых от маток ягнят**

Жаркие дни при наличии большой испаряющейся оказывают угнетающее действие на отбитых от матери ягнят. Для предупреждения этого устраиваются навесы, под которые загоняется в жаркие часы вся отара ягнят до 500—600 голов. Площадь навеса рассчитывается так, чтобы на каждого ягненка приходилась половина квадратного метра площади, высота навеса 1 метр (рис. 7).

#### **Подкармливание ягнят**

При плохих выпасах отбитых от овец ягнят необходимо подкармливать. Для этого вблизи навеса устраиваются для них кормушки. Обычным кормом является сыворотка, смешанная



**Рис. 7. Навес для отбитых от маток ягнят**

с отрубями (100—150 грамм для каждого ягненка) и 2—3 граммами соли. Сыворотка перед дачей подогревается до 60—70° С для предупреждения распространения туберкулеза. Подкармливание производится в полдень. Отруби можно заменять свежим раздробленным жарьком.

**Гассан Али Омер**

---

**Максимум внимания использованию овечьего молока — организации брынзоделия! Овцеводство в 1931 г. должно дать рабочему снабжению 55 тысяч тонн молочных продуктов**

---