

О ТРЕХ ОКОТАХ ОВЕЦ В ДВА ГОДА В СОВХОЗЕ СЕВЕРНОГО КАЗАКСТАНА

(В порядке обсуждения)

Вопрос о трех окотах овец в течение двух лет уже неоднократно поднимался в Овцеводобединении.

Но этот вопрос большого сочувствия не встретил ни у старых, ни у молодых зоотехников. Старые зоотехники высказались категорически против трех окотов в два года, указывая, что это противоречит природе животного, что охота к случке проявляется у животных только в определенный период времени — осенью.

Основные принципы старой зоотехнической науки, которая занималась только отысканием наиболее рациональных способов содержания, кормления и размножения, имея в виду путем изменения условий достигнуть изменений и в животных, — должны быть решительно пересмотрены. Современная советская зоотехника должна шагнуть далеко вперед и не ограничиваться повышением продуктивности животных только старым методом — путем изменения условий содержания, но и стать на путь радикальной перестройки самого организма животного.

Вековая кастрация, искусственное осеменение и омоложение — это уже крупные шаги на пути к активной перестройке продуктивности животного.

И вопрос об охоте овец к случке только в определенный период года в данное время уже окончательно разрешен. Он разрешен не только современной зоотехнической наукой (которая овладевает методом даже искусственного возбуждения охоты у животных в любое время путем введения в организм овцы настоя из нижней мозговой железы), но и практикой Союзмяса. В наших казахстанских совхозах от овец, полученных от Союзмяса, где овцы содержались в постоянном смешении с баранами, мы имеем ягнят всех возрастов — от 1 до 12 месяцев. В этих же совхозах наблюдается, что матки, у которых произошел выкидыш, уже в бли-

жайшие 1—1½ месяца снова проявляют охоту к случке.

Несомненно, причина появления охоты у овец только в определенное время года такова: в течение длинного ряда лет по хозяйственным соображениям случка овец приурочивалась только к определенному времени года, — организм животного в конце концов был приучен к определенному режиму в отношении охоты. Союзмясо в корне изменил эти условия, изменилась и периодичность появления охоты.

Следовательно сроки случки и число их не имеют строгих ограничений и для проектируемого нами трехкратного окота в два года преград биологического порядка нет. Нужно только чтобы матка была не ниже средней упитанности и налицо были бы активные бараны.

Для успешного проведения трех окотов в два года должны быть налицо два условия: теплые, светлые и просторные кошары и прочная кормовая база. Кошары постройки 1931 года в своем подавляющем большинстве отвечают первому условию. Что же касается другого условия — кормовой базы, то она в настоящее время не может считаться удовлетворительной для содержания овец с более интенсивным плодоношением.

В области изменения кормовой базы мы должны принять самые решительные и радикальные меры. Нам необходимо отказаться от сплошных ковыльных степей. Нам необходимо значительно уменьшить, что называется, перекореджить, в корне изменить ее физиономию, чего можно достигнуть путем вспашки засева культурными травами. Наряду с этим нам необходимо в пределах наших совхозов увеличить добычу фуражного зерна. И то и другое полностью обеспечивается немедленным введением в наши хозяйства проектируемых нами севооборотов и связанного с ними завоза тракторов и инвентаря.

Далее мы стоим перед вопросом ее времени производства случек и получения окотов — трех в два года. Поэтому желательно было бы по возможности приучить к более теплому времени, а главное приурочить воспринятие ягнят к лучшим выпасам. Подножный сезон содержания овец в Северном Казахстане надо считать с 15

пределяется по 1 ноября. В кормовом отношении этот сезон далеко не однобразен — степь в течение этого времени регулярно оживает два раза: весной — с половины апреля до половины июня и осенью — с половины августа до холодов. В промежуток же с 15 июня до 15 августа степь от стоящих знойных дней постепенно высыхает, замирает. В это время овцы недоедают. К этому времени необходимо приурочить подкармливание силосом. Большую поддержку должны оказать пожнивья от величившихся в наших хозяйствах поевов. Не исключена возможность создания и искусственных выпасов.

Наиболее разнообразны, питательны и сочны бывают корма с конца апреля и весь май. Со второй половины августа начинает пышно развиваться типичная растительность, свежие побеги, — степь снова становится «сытой».

Температура, а главное наличие кормов, должны регулировать сроки окота. Первую случку целесообразно производить в августе с окотом в январе, вторую — в апреле с окотом в сентябре, третью — в декабре с окотом в мае. При таком распределении мы имеем два окота в теплое время, с возможностью использования ягнятами в первое время лучших весенних и осенних выпасов, и один окот зимний, продукцию которого желательно было бы использовать на убой (в виде молочных ягнят). Лучших ярок желательно подержать до сочных апреле-майских выпасов.

Нужно при воспитании ягнят под матками покончить еще с одним вековым предрассудком — индивидуальным приручением ягнят только к своим матерям. Пора перейти к групповой кор-

межке ягнят. Это позволило бы наиболее полно использовать более молочных маток. Не получалось бы так много ягнят сирот-заморышей, заранее обретенных на гибель.

Далее мы остановимся на случке, которую по нашим инструкциям разрешается растягивать до 45 дней. Возможно, что в первое время при изменении сроков случки этот срок при всем нашем желании сократить нельзя будет. Однако необходимо по нашим хозяйствам уже теперь — и тем более при увеличении числа случек — отказаться от оставления на зиму отар, которые будут котиться не менее 45 дней. Ведь при этих условиях начало и конец окота могут совпадать с очень холодными и совершенно теплыми днями, а это при достаточной пестроте наших кошар в отношении их отопления нельзя признать правильным. Мы бы предложили формирование отар приурочить к случной кампании и производить его по мере поступления овец в случку, отбивая, скажем, в отдельные отары маток, пошедших в случку в первые 10—12 дней. Если по времени случки окот будет совпадать с холодным временем, то первые отары необходимо формировать с меньшим поголовьем и размещать их в самых теплых кошарах и с лучшим при них кормом. Отары последнего формирования могут быть более многочисленными и уже могут быть размещены в менее теплых кошарах.

Такое формирование даст нам более однородные отары, что поведет к более благоприятным результатам при воспитании ягнят под матками и при подножном их содержании. Такая однородность отар также весьма важна при дойке овец, при отбивке ягнят и при новом назначении срока случки.