

# Книга

А. П. Маркушин

## Нужно исправить серьезные недочеты

Проф. Л. К. Гребень — Кормление овец в совхозах и колхозах. Селькохозгиз. 1931. Тир. 20 000. Цен. 60 коп. Редактор Моисеев.

На бедном овцеводческой литературой книжном рынке в конце 1931 г. появилась книга проф. Л. К. Гребень «Кормление овец в совхозах и колхозах». По вопросам кормления овец до последнего времени обстоятельно написанной книги не было. Разноречивые и очень короткие данные разбросаны были по отдельным источникам и руководствам кормления с.-х. животных. Проф. Гребень постарался систематизировать имеющийся материал и привести экспериментальные данные опытных учреждений подводящих научную основу в вопросы норм и организации кормления в овцеводческих совхозах и колхозах.

Расположив в достаточно строгой и удачной последовательности материал и популяризовав его, проф. Гребень дает возможность пользоваться своей книгой студентам вузов с овцеводческим направлением (хотя для них она несколько популярна), слушателям техникумов и различных курсов, а также практическим работникам. Отдавая должное проф. Гребеню в том, что его книга облегчает изучение кормления овец, нужно однако отметить что в ней имеется много неясностей, неточностей и даже неверных сведений, которые могут вводить учащихся в заблуждение, а практических работников ориентировать на неточную постановку дела кормления овец в условиях овцеводческих совхозов и колхозов.

Автор рекомендует вводить в рацион овец солому в размере 25—75% по отношению к другим кормам, что составляет в сутки от  $1\frac{1}{2}$  до 4 кг; в том же размере, по указанию автора можно давать ячменную и пшеничную мякини. Вызывает однако сомнение, сможет ли овца в течение дня продуктивно использовать 4 кг соломы или мякини. При трехкратном кормлении,

которое рекомендует проф. Л. К. Гребень, овца даже не успеет пережевать 4 кг, так как 10 фунтов соломы (4 кг) по объему почти равняются объему овцы. К тому же 25% будет еще заменяться другими кормами.

Взрослой овце по проф. Гребню, силос можно скармливать до 5 кг, ягнята свободно поедают 3—4 кг, в таком же количестве свеклу и морковь.

Автор не указывает, какую породу и живой вес он подразумевает под взрослой овцой и какой возраст ягнят. Но при всех обстоятельствах ячу силоса в таких больших количествах для взрослых овец и ягнят вряд ли можно рекомендовать.

Подсосным маткам автор рекомендует давать 4 кг силоса, а сухим мериновым маткам за месяц до окота грубых кормов (соломы и сена) — 1,3 кг и силоса 1 кг, а всего объемистых и водянистых кормов 2,3 кг; эти дачи нельзя считать чрезвычайно преувеличенными. Такой рацион на последнем месяце беременности может привести к преждевременным родам — выкидышу.

Не внесена ясность в вопрос, — какое сено скармливать в начале зимы — хорошее или плохое. Автор рекомендует в начале стойлового периода давать сено плохое, а зимой, когда холода отнимает много тепла от организма, — хорошее. Такой совет вряд ли целесообразен, так как сразу после пользования сочным кормом на пастбище, овцы плохо будут поедать сено низкого качества. Тем самым количество остатков может оказаться слишком большим, и овцы быстро потеряют в весе. Сено плохое и хорошее в течение стойлового периода лучше скармливать вместе в разное время дня (хорошее вначале, плохое — после обеда).

Дальше автор не рекомендует закладывать сено на ночь потому, что оно пропитывается аммиаком, приобретает неприятный запах и плохо поедается. Если его давать в умеренном количестве, т. е. когда ведется кормление по нормам, то сено, прежде чем подвергнуться действию аммиака,

будет съедено. В другом же месте автор рекомендует давать на ночь именно сено (при кормлении слабых овец — «хурды»).

Проф. Гребень протестует против скармливания сена на снегу. Нельзя конечно это кормление считать целесообразным, но в совхозах, и особенно новостроющихся к этому приходится прибегать, да кстати многие опытные данные подтверждают, что при разбрасывании сена на снег оно хорошо поедается (другой вопрос — о неэкономичности такого способа кормления). Задрязнения в данном случае в просторном базу не происходит. Заболеваний овец простудного характера от поедания снега также не наблюдается (из беседы с сотрудниками Элигинской зональной овцеводческой станции). При оттепелях, а также во время дождей от скармливания сена на снегу надо конечно воздерживаться.

Далее указывается, что овца в жаркое время за один прием может выпить воды до 12 литров

(1 ведро). Таких данных в литературе, а также в работах опытных учреждений — нет. Вероятно, это заключение основано на небольших собственных наблюдениях, достаточно не проверенных.

Питье овец зимой рекомендуется проводить только в помещениях, заранее привезенной и согретой водой. Но так как многие совхозы и особенно вновь организуемые еще недостаточно оборудованы, не имеют чалов и баков для хранения воды, а вынуждены гонять овец на водопой к колодцу, реке или пруду, то надлежало бы указать наиболее рациональные способы поения в этих условиях.

Таковы недостатки и пробелы в книге проф. Л. К. Гребень, которые должны быть исправлены в следующем издании. По исправлении отдельных недостатков книга будет иметь большую ценность для работников овцеводческих совхозов и колхозов.

#### Редакция:

**Я. И. Соломенцев (отв. редактор)**

**С. П. Голубев**

**Р. Н. Гасюк**

**Ф. А. Хейфиц**

**Издатель Сельхозгиз**

**Техническое оформление Ф. Российского**

**4 печ. л. 1/16—74×105 73 000 в 1 печ. листе**

**Уполн. Главлита Б—24529**

**Тираж 8 200+165**

**Зак. № 1631**

**18-я тип. треста «Полиграфнога»**

**Москва, Варгунихина гора, 8**