

ПЕРЕД ОКОТНОЙ КАМПАНИЕЙ

ОБЕСПЕЧИТЬ УСПЕШНОЕ ПРОВЕДЕНИЕ ОКОТНОЙ КАМПАНИИ

Б. ФИЛИППОВ

В 1932 году в овцеводческих совхозах случено 2920 тыс. маток, от которых в 1933 году необходимо получить на момент отбивки не менее 2400 тыс. живых ягнят.

В 1931 году было случено около 2900 тыс. маток, от которых фактически получено было в 1932 году около 1800 тыс. ягнят. При почти одинаковом количестве маток, шедших в случку в 1931 и 1932 гг., в 1933 году необходимо получить ягнят на 400 тыс. голов, или на 22% больше, чем было фактически получено в 1932 году. Из этих цифр каждый работник овцеводческой системы должен осознать те огромные и ответственные задачи, которые поставлены в предстоящую окотную кампанию. Основной установкой для всех работников системы овцеводческих совхозов должно быть то, что в 1933 году «особенно важно добиться выполнения заданий по приросту стада рогатого скота, свиней и овец, в колхозных товарных фермах и в животноводческих совхозах» (из доклада т. Молотова на обединенном пленуме ЦК и ЦК ВКП(б) 8/1 1933 г.).

Основным моментом борьбы за приплод является правильное проведение случной и окотной кампаний. Случная кампания 1932 г. проведена значительно успешнее, чем в 1931 году.

В то время как в 1931 году случная кампания затянулась до 10 февраля, в настоящем году она в основном закончена к 10 января, т. е. на целый месяц раньше.

Если в 1931 году в ряде совхозов (№ 4 Сев. Кавказ, Бажиган и др.) имелся повышенный процент повторности

при искусственном осеменении (до 47—50%), в настоящем году процент повторности колеблется от 15—25, не превышая ни в одном случае 35.

Количество маток, оставшихся непокрытыми, по подавляющему большинству совхозов не превышает 2—3%.

Это дает основание считать, что случная кампания 1932 г. явилась действительно переломной по большинству совхозов в смысле решительного снижения недопустимо высокого в прошлые годы процента яловости.

Но случная кампания только первый этап борьбы за приплод. Сейчас же по окончании случки необходимо организовать правильное зимнее содержание слученного поголовья и своевременно подготовиться к окоту.

Что необходимо сделать для того, чтобы полностью выполнить план прироста стада в 1933 году?

1. Нужно организовать зимовку слученного поголовья таким образом, чтобы максимально сохранить маточное поголовье и недопустить распространения выкidyши.

2. Организовать кормление маточно-го поголовья с таким расчетом, чтобы к началу окота, т. е. к моменту усиленного расходования маткой питательных веществ, матки пришли в состояние не ниже средней упитанности.

3. Организовать проведение самой окотной кампании с расчетом строжайшего учета рождающегося приплода и максимального его сохранения.

Сейчас же по окончании случной кампании нужно забронировать за маточными отарами крма (грубые и концентраты), необходимые для проведения зимовки и окота. Грубые корма должны быть немедленно подвезены к самим кошарам, при которых стоит маточное поголовье. Необходимо самым серьезным образом учесть уроки зимовки 1931/32 года, когда в ряде совхозов (№ 3 Сев.-Кавказского треста, Червление Буруны, Дагестанского треста, Бурлинский, Зап.-Казахстанского треста и ряд других) маточное поголовье гибло от бескорミцы, вследствие того, что имеющиеся в совхозе корма не были своевременно подвезены к кошарам.

При обеспеченности поголовья кормами необходимо учсть, что для ма-

точного поголовья должны быть выделены корма вполне доброкачественные, так как корма недоброкачественные (гнилые и прелые) на матках отражаются особенно неблагоприятно, вызывая массовые выкидыши.

Кроме обеспечения маток доброкачественными кормами, необходимо тщательно следить, за тем, чтобы уход за матками был самый осторожный, в особенности в последние 2 месяца беременности. Впуск и выпуск маточной отары из овчарни должен всегда производиться всей чабанской бригадой. Два человека при этом должны становиться у столбов ворот с целью предотвращения давки овец в воротах и в особенности ушибов овец о столбы.

Поение котной маточной отары также должно производиться не менее как 3 людьми. К корытам матки должны подпускаться не все сразу, а маленькими партиями по 20—30 голов. Образующийся около мест поения лед должен скользить во избежание скольжения и падения маток во время поения. В течение всего зимнего и предокотного периода матки должны получать соль. Соль (желательно в виде лизуница) необходимо иметь в рештаках, поставленных по стенкам овчарни, к которым овцы имели бы постоянный доступ. Периоды в даче соли необходимо избегать. Если же таковой произошел, то первую дачу соли в этом случае необходимо произвести весьма осторожно, рассыпав небольшое количество соли длинным следом по тырлу, и только после того, как овцы уже снова привыкнут к соли, насыпать ее в рештаки, со свободным к ним доступом маток.

Особенное внимание в течение зимнего и предокотного содержания маток необходимо обратить на строжайший учет выкидышей.

Каждая скинувшая овца должна быть немедленно выделена из отары и передана в изолятор. Абортированный плод, вместе с соприкосавшейся с ним подстилкой должен быть немедленно уничтожен (сожжен или закопан), место выкидыша должно быть продезинфицировано. Скинувшая овца, доставленная в изолятор, должна обязательно исследоваться ветперсоналом для установления причин выкидыша.

Если выкидыши имеет инфекционное происхождение, то отара, в которой он произошел, должна быть немедленно карантинирована; если выкидыши не имеет

инфекционного характера, необходимо тщательно проверить качество кормов и условия содержания этой отары.

Скинувшие и собранные в изолятор овцы не должны возвращаться в свои отары до конца окота. После него в зависимости от их количества и окончательного заключения ветперсонала характер выкидышей эти овцы или формируются в отдельную отару, или возвращаются в свои прежние отары.

Учитывая, что иногда отдельные чабаны скрывают случаи выкидыша в своих отарах, необходимо провести среди них разъяснительную работу по этому вопросу. Необходимо разъяснить чабанам, что в результате несвоевременного обнаружения выкидышей и непринятия соответствующих мер борьбы с ними выкидыши могут распространяться в широких размерах. В этом отношении необходимо серьезно учсть уроки 1932 года, когда в некоторых совхозах выкидыши получили распространение до 5—10% от маточного поголовья (Мечетинский, Мариановский, Бурлинский; Тингутинский, Алтыбаевский и др.).

Необходимым условием правильного, зимнего содержания маток является полная ликвидация обезлички в уходе за овцами. Должны быть закреплены за маточными отарами не только чабанские бригады, но и весь зооветперсонал.

К каждому технику-овцеводу и вет-технику должны быть прикреплены отары маток, за которые данный специалист должен нести ответственность.

В течение последнего месяца беременности необходимо организовать усиленное кормление маточного поголовья. В этот период ювца расходует значительное количество питательных веществ на образование тела ягненка и кроме этого в это время ей необходимо создать запас питательных веществ для последующего за ягнением кормления ягненка. За месяц до начала окота маток, в особенности более слабых, необходимо начать подкармливать концентратами. Концентраты должны даваться из расчета 100—200 г в день на голову (в зависимости от породы и состояния маток). Дачу концентратов необходимо производить из рештаков, имея на каждые 20—25 маток один рештак. Рештаки с концентратами лучше всего ставить с подветренной стороны кошары. С утра овцам необходимо дать одну давалку сена, затем напоить их и после этогопустить к рештакам с концентратами,

следя, чтобы при этом не было давки овец у решеток.

При отсутствии в хозяйстве концентратов для последнего месяца беременности необходимо забронировать для маток наиболее питательное сено (лучше всего из бобовых трав). Кроме этого в последнем месяце беременности желательна дача овцам тертого мела для возмещения усиленного в этот период расхода кальция на образование костей ягненка. Тертый мел лучше всего насыпать в решетки с солью, к которым овцы должны всегда иметь свободный доступ.

В предокотный период необходимо обратить особое внимание на качество кормов и не допускать скармливания недоброкачественного корма.

В этот период необходимо также избегать всякой излишней ломки овец. Пропускание через раскол (при счете, переборке и пр.) необходимо разрешать только в случаях действительной необходимости.

Всякое изменение кормового рациона в этот период (начало подкормки концентратами, изменение сена и пр.) следует производить постепенно, приучая в течение нескольких дней овец к новому корму.

Перед началом окотной кампании необходимо провести следующие мероприятия:

1. Не позже как за месяц до начала окота должен быть закончен просмотр и ремонт кошар и тепляков, в которых находится маточное поголовье. К этому сроку в этих кошарах и тепляках должны быть закрыты все щели и застеклены все разбитые окна. Кроме этого, учитывая, что ряд совхозов (Крымского, Алма-атинского, Вост.-казакстанского и других трестов) начали случную кампанию несколько раньше против обычного срока, необходимо произвести утепление кошар и тепляков. В тепляках должны быть поставлены кирпичные печи с соблюдением противопожарных правил, в кошарах необходимо сделать временный потолок (настлать доски, покрыть их камышом и засыпать сверх камыша об'едьями или соломой) и в случае необходимости, утеплить стены.

2. За 2—3 недели до начала окота во всех кошарах, при которых будет проводиться окот, необходимо вырезать кизяк, выровнять пол, продезинфицировать пол и стены кошары (известковым

молоком), после чего застлать пол толстым слоем свежей подстилки.

3. К этому же сроку необходимо доставить к этим кошарам весь необходимый для окота инвентарь и материалы: щиты (30—35 на отару), клетки или «сострого» (по 40—60 на отару), колья и проволоку (для устройства оцарков), краску, шпагат, фонари «летучая мышь» и пр. Эти, казалось бы, «мелочи» безусловно необходимы для нормального проведения окота и отсутствие их приводит к смешиванию самцов, путанице и потере, двоен, что вызывает повышенный отход молодняка и недостаточное его развитие.

Кроме этого к кошарам необходимо подвести достаточное количество подстилки для периодической очистки и дезинфекции кошары в период окота.

4. За 3 недели до начала окота у маточного поголовья должна быть произведена стрижка «хвостьев», т. е. грязной шерсти вокруг заднего прохода, внутренней стороны ляжек и вымени. Стрижка хвостьев должна производиться весьма осторожно во избежание выкидышей.

5. Своевременно обеспечить отары самцами.

6. За 10 дней до начала окота провести смотр готовности к окоту каждой отары.

Успешное проведение самой окотной кампании возможно только при условии организации конкретного, оперативного руководства ею.

Необходимо особенно подчеркнуть, что административно-технический персонал целого ряда совхозов не уделял в 1932 г. должного внимания подготовке и руководству окотной кампании.

Многие директора совхозов вследствие совпадения с окотным периодом весенней посевной кампании не сумели руководить обеими кампаниями одновременно и зачастую совершенно «забывали» про скот, вследствие чего в ряде совхозов эта важнейшая кампания была представлена самотеку.

Дело доходило до того, что в отдельных совхозах в период окота у ветзооперсонала распоряжением директоров отбирались лошади для переброски их на посев кампанию, в результате чего окот проходил совершенно безнадзорно.

Ярким примером подобного «руководства» юкотной кампанией является совхоз Кзыл-Чарводар, Узбекского треста.

Директор этого совхоза (Орлов) по окончании юкотной кампании даже не поштерсовался узнать, сколько же получено приплода. После юкоты маток утинали на летние пастбища за 100—150 км, даже не посчитав ягнят.

Этот совхоз на неоднократные запросы Об'единения о результатах юкоты, несмотря на то, что юкот юкончился к 1/V, ответил 7/VI присылкой «ориентировочных» сведений о количестве приплода. Этот же совхоз за период подготовки проведения юкоты по двум только участкам «смены» 7 помовцеводов.

В результате подобного «руководства» юкотом в ряде совхозов в 1932 году наблюдалось чрезвычайно повышенная гибель приплода в период юкоты (Сев.-кавтрест — совхоз № 7 — 15%, совхоз № 13 — 27%, совхоз № 15 — 28%, Тингутинский — Н. Волга — 30%, Ужурский — Зап. Сибирь — 34%, Новоселовский — Вост. Сибирь — 25%, Приволье — Украинский — 15%, и др.), чём в основном и было вызвано невыполнение плана прироста стада в 1932 году.

Совершенно недостаточное руководство юкотной кампанией в ряде совхозов в 1932 г. приводило кроме повышенного падежа к значительному недоучету рождающегося приплода. Это доказывается наличием крайней пестроты количества, двоен по разным совхозам, имеющим примерно одинаковый породный состав стада и находящимся примерно, в одинаковых условиях. Например совхоз «1 мая», Укровцеводтреста, показывает, что у него было в 1932 г. только 0,7% двоен, тогда как совхоз Циммервальд, этого же треста, имеющий примерно одинаковый породный состав маток, в этом же году имел 9% двоен, т. е. в 13 раз больше. Подобное отношение к руководству юкотной кампанией, создающее благоприятную почву для хищения и потерь от падежа молодняка, совершенно недопустимо в 1933 году.

За каждым веттехником и техником-овцеводом должны быть закреплены на юкотный период те же маточные отары, которые они обслуживали в зимний период, с тем чтобы эти лица ежедневно посещали каждую из прикрепленных к ним отар с целью проверки хода и учета юкоты и оказания необходимой помощи.

Ветеринарный врач и зоотехник-овцевод совхоза в период юкоты должны все время об'езжать отары, обеспечивая нормальное его проведение в каждой маточной отаре. Директор совхоза обязан знать фактическое положение дела на каждый день юкотного периода и немедленно устранять причины, мешающие успешному его проведению.

В 1932 году ряд совхозов показали образцы хорошего проведения юкотной кампании и добились неизначительного процента гибели приплода (Сев.-кав. трест — совхоз № 11 — 2%, совхоз № 12 — 2%, Н.-волжский трест — совхоз Алтайский — 3%, Украинский трест — совхоз «Волынский» — 3%, Циммервальд — 5,2%, Запсибтрест — Рубцовский — 2,1% и ряд других).

В 1933 г. налицо ряд благоприятных предпосылок для успешного проведения кампании — закончившаяся реорганизация системы и приближение руководства к производству, отсутствие непланового юкоты, наличие у всех совхозов не менее годичного производственного опыта, более успешное проведение случной кампании и пр.

Каждый работник системы должен отчетливо осознать, что 1933 год «должен стать поворотным в рюсте социалистического животноводства, что имеет громадное значение как для самого сельского хозяйства, так и для дальнейшего улучшения дела продовольственного снабжения наших городов» (из докл. т. Молотова на пленуме ЦК и ЦК КВКП(б) 8/1 1933 г.).

ЮКОТ РОМАНОВСКИХ ОВЕЦ

Л. С.

Главная масса романовских овец ягнится в январе-феврале. Данное время считается наиболее удобным и желательным для юкоты маток. Родившиеся ягната выходят на пастбище в возрасте 4-5 месяцев. Они имеют значительное преимущество перед весенними и летними ягнётами. Хорошо развитые, вполне окрепшие ягната легче переносят как климатические, так и кормовые изменения.

Экономические условия также заставляют приурочивать юкоту на январь-