

ОКОТ И ВОСПИТАНИЕ МОЛОДНЯКА

СОХРАНЕНИЕ МОЛОДНЯКА.
БОЕВАЯ ЗАДАЧА
ОВЦЕСОВХОЗОВ И КОЛХОЗОВ

БЕСЕДА С ЧАБАНАМИ

КАК ПРОВЕСТИ ОКОТ И СОХРАНИТЬ МОЛОДНЯК

Вступление

Партия и правительство в настоящее время уделяют самое серьезное внимание разрешению животноводческой проблемы. Животноводство надо быстро развить, чтобы оно смогло дать стране запроектированные планом количества дешевого мяса, молока, жиров, кож, шерсти и другого сырья. Для выполнения этого надо всем работникам животноводческих социалистических хозяйств по-ударному взяться за поднятие качественных и количественных показателей своего производства. В частности надо биться за максимальное сохранение приплода ягнят в текущем году, ибо это является решающим фактором в борьбе за расширенное воспроизводство стада. Поэтому каждый рабочий овцеводческих хозяйств, каждый колхозник должен по-ударному провести окотную кампанию и создать условия наилучшего сохранения молодняка. Естественно, что наилучших результатов добьется тот чабан, который и хорошо работает и знает свое дело. Знать свое дело можно, изучая его и в практике и в теории.

Настоящая статья имеет своей целью дать чабану минимум тех знаний, ко-

торые нужны ему для того, чтобы провести окот так, как этого требует зоотехническая наука.

1. Подготовка отары к ягнению

Сплошь и рядом при неправильном содержании суягные матки дают большой процент выкидышей. Выкидыши являются главным образом следствием давки маток при кормлении зерном, при водопое и вообще при выпуске отары из кошары (овчарни).

Многие овцеводы с целью избежать выкидышей прекращают за 1—1½ месяца до ягнения дачу суягной отаре зерна, за 2—3 недели — соли. Это приводит к истощению материнского организма, к недоразвитию ягненка в утробе матери и упадку молочности матки при ягнении. А потому надо строго осудить такой способ ликвидации выкидышей. Надо признать за правило, что суягную матку во 2-й период беременности обязательно надо бесперебойно кормить концентрированными кормами до самого ягнения. Размер дачи в среднем — по 0,2 кг на голову.

Ликвидировать же давку можно тем, что ютара разбивается на несколько групп, размером каждая в 200—300 голов. Разбивка производится по признаку явной беременности матки.

Переносными щитами группам отгораживаются отдельные участки — кошары (оварки), так что они не смешиваются. Разбивку отары надо начать за 1—1½ месяца до ягнения. Для этого вся отара небольшими группами (по 20—30 голов) просматривается чабанами весьма осторожно, чтобы не мять и не давить матку. Всех маток с явными признаками беременности, как-то: с «налитым» выменем, с сильно развитым брюхом и т. п., выделяют в отдельную группу. При просмотре проводится подстрижка шерсти на вымени, на ляжках и на хвосте, а также делается обрезка копыт. Подстрижка шерсти на вымени необходима для того, чтобы ягненка при сосании не заболевали поносом, так как на заросшем шерстью вымени ягненку трудно будет захватить в рот сосок без шерсти.

Некоторые овцеводы проводят подстрижку при ягнении. Это совсем пло-

хо, так как после родов матка обес- силена, а ее изнуряют стрижкой. Поэтому надо подстригать вымя и зад за 1—1½ месяца до начала ягнения.

Выделенной для близкого ягнения группе отводят в кошаре самое просторное, теплое и чистое помещение. За этой группой надо вести более тщательный уход, и давать лучшие корма. Через 10—15 дней из отары снова выделяются в отдельную группу все матки с явными признаками скорого ягнения. Вновь выделенная группа размещается в кошаре первой, и за ней точно так же, как и за первой, ведется более тщательное наблюдение. Такое выделение из отары скоро ягнящихся маток необходимо вести до конца ягнения через каждые 10—15 дней. Например ягнение у нас должно начаться 15 апреля, следовательно первый отбор маток делается во второй половине марта, а затем проверяется 5, 20 и 30 апреля. В тех овцеводческих хозяйствах, где выделения маток не делают из-за боязни давки, получаются большие проценты выкидышей и большой отход ягнят, так как в тысячной отаре скоро ягнящимся маткам не предоставляется соответствующий для нормального развития плода и для нормальных родов. Следовательно необходимо добиваться, чтобы еще до начала ягнения в отаре была сделана разбивка маток на группы — по признакам скорости ягнения.

2. Подготовка овчарни (кошары) к ягнению

Кошара, в которой будет проходить ягнение, должна соответствовать зоогигиеническим требованиям, т. е. в ней должно быть чисто, сухо, светло и тепло. Подготовку кошары к ягнению надо заканчивать за 10—15 дней до начала ягнения. Например при начале ягнения 15 апреля кошара должна быть вполне оборудована к 5 апреля.

Прежде всего из кошары вывозится накопившийся за зиму навоз (кизяк). Затем производится побелка стен негашеной известью (для дезинфекции). Кроме того ветеринарный надзор должен произвести дезинфекцию кошары раствором креолина или карболки (5—10-процентный раствор). Чтобы в кошаре не было сырого, надо удалить полностью снег с крыши и отбросить сугробы от ворот и стен. Нужно обязательно добиться, чтобы весенние воды

не смогли проникать в кошару. Для этого необходимо устроить у дверей присыпки, а вдоль стен — канавки. Необходимо также заготовить определенное количество сухой соломы для подстилки.

Чем больше будет света в окотной кошаре, тем лучше. Как минимум в ней должно быть света $\frac{1}{15}$ площади пола. Это значит, что на каждые 15 кв. м пола должно быть окон по 1 кв. м. В темных кошарах юкот (ягнение) проводить нельзя, так как будет большой отход ягнят. Поэтому под ягнение надо отводить самые светлые кошары. Для сохранения теплоты в кошаре необходимо, чтобы окна имели двойные рамы. Затем надо твердо усвоить, что для новорожденных ягнят требуется помещение с температурой не ниже 12° по Реомюру. Для 10-дневных ягнят температура может быть 8°, а для взрослых ювец 4°. Следовательно в окотной кошаре необходимо устроить помещения с температурой в 12, 8 и 4 градуса. Чтобы добиться температуры в 12 градусов, необходимо отеплить всю кошару и кроме того устроить отдельное помещение с печкой, так называемое родильное отделение. Затем надо отдельить помещение для ягнят с температурой в 8 градусов, отгородив его от ющих кошары стеной с дверями. На устройство родильного отделения надо обратить особое внимание. В нем должна соблюдаться идеальная чистота. Проводить ягнение без родильного отделения — значит умышленно увеличивать отход ягнят. Необходимо установить как правило, чтобы ни одна матка не ягнилась вне родильного отделения. Поэтому в тех хозяйствах, где еще не устроены для юкот теплые помещения, сейчас же надо отдельить хотя бы временными перегородками участок кошары для родильного отделения. В этом отделении нужно проводить ягнение, соблюдая все зоогигиенические требования.

Родильное отделение надо устраивать рядом с помещением, где стоят ягнящиеся матки. Внутри его устраивают станки, или юстроги, для маток с ягнятами. В родильном отделении матка с ягненком будет находиться нескользко часов, а затем переводится в следующее помещение, где устроены одинарные и многоматочные станки (юстроги, сакманы). Расположение их видно на рисунке. Матка с двойнями или со слабо

бым ягненком ставится в острог, т. е. в одинарный станок, размер которого около 1 кв. м.

Матка же с нормально развитым ягненком ставится в сакман, т. е. в станок для 5 маток. На третий день из острогов и 5-маточных сакманов ягната переводятся в 15-маточные станки, где они находятся три дня. По истечении этого срока ягната переводятся на пять дней в сакманы на 30 гол. Десятидневных ягнят надо сводить в сакманы по 60 голов на 10 дней. Двадцати же дневных ягнят необходимо группировать по 180—240 маток. Конечно слабо развитых ягнят или маломолочных маток надо держать дальше в маленьких сакманах, чтобы за ними иметь большее наблюдение.

Такое плановое движение ягненка даст возможность не ослаблять за ним внимания все время, а тем самым сохранять жизнь ягнят, обеспечивая нормальное развитие их.

Надо соблюдать такой порядок: к вечеру родильное отделение необходимо освобождать от маток для того, чтобы дежурный чабан ночью сразу же мог размещать всех ягнящихся маток. При большом количестве ягнящихся маток надо освобождать и несколько станков, примерно для 5 маток. Кроме того обязательно надо ближайшие к дверям станки отеплить, т. е. устроить двойные стенки из щитов, заложив между ними солому. Несоблюдение этого вызовет отход ягнят от простудных заболеваний. Надо также и ворота отеплить, устроив около них тамбуры, а в них надо сделать маленькую калитку для прохода людей.

3. Учет ягнения

Учет ягнения у нас поставлен крайне плохо. Сводки о ходе ягнения и о падеже ягнят в большинстве случаев даются только по пятидневкам. Надо же добиться того, чтобы сводки давались ежедневно. Для организации правильного учета надо установить строгий порядок в лечении всех ягнят, идущих через родильное отделение. Как правило надо признать такой порядок: каждый ягненок и его матка, переводимые из родильного отделения в острог или в пятиматочный сакман, должны тут же помечаться очередным номером. Но-

мера надо ставить краской. Цифры для номеров не должны быть большими. Их выгибают из толстой проволоки. Краска для черных ягнят должна быть белой, а для белых — красной или черной. Номера ставят на правой ляжке. Чтобы краска не стиралась, надо ее разводить на олифе до густоты сметаны. Не надо густо погружать цифры в краску, так как иначе номер растирается, и ничего не видно.

4. Кормление ягнившихся и суягных маток

Всех маток первые пять дней после ягнения можно кормить в кошаре в тех острогах и сакманах, где они находятся. Корма для них должны быть наиболее питательными. Надо им давать самое лучшее сено, концентраты и силос. Кормить необходимо не более 3 раз в день. Сено задается утром и вечером по 0,6—0,8 кг на голову в одну дачу. Зерно надо давать после водопоя в размере, 0,2—0,3 кг на голову. Силос (надо смотреть, чтобы он был доброкачественный) как молокогонный корм задается после зерна. Размер дачи — до 1 кг.

После пяти дней сакманы в хорошую погоду надо выгонять на степь для пастбища. Но выпасы эти должны быть вблизи кошары, для того чтобы в случае ненастия ягнят можно было сразу загнать назад в кошару.

Точно так же группа отобранных суягных маток должна пастьись здесь же, у кошары. Это даст возможность каждую начинаяющую ягниться матку немедленно отогнать в родильное отделение. Ввиду того, что эти матки полностью пастишие использовать не смогут, их надо обязательно подкармливать ежедневно сеном из расчета по 0,4 кг на голову и зерном хотя бы по 0,2 кг. Сено полезно задавать с утра до выгона, а зерно — после водопоя.

В настоящее время в овцеводческих хозяйствах принят способ пасти всю суягную отару вместе, причем выпасы большей частью расположены за 2—4 км от кошары. Такой способ не верен. Суягную матку, которая скоро об'ягнится, гонять незачем. От этого кроме вреда ничего не будет. Для доставки с пастбища ягнящихся маток обычно строятся особые телеги — матковозки, перевози-

мые волами. Однако матковозка в настоящее время служит источником заразы, так как содержать ее в чистоте трудно, а заменить собой родильное отделение юна не сможет. При организации же ближних выпасов надобность в матковозке отпадает сама собой. Во многих южных овцеводческих хозяйствах при каждой ютаре держат по 2—4 «царапа», т. е. кастрированного козла, которые «сопровождают» матку в родильное отделение. Способ этот удобен. Царев надо иметь во всех овцеводческих хозяйствах.

5. Помощь при родах

В чабанской бригаде должно быть два лица, хорошо знающих устройство половых органов овцы. Обыкновенно это будут бригадир и его заместитель (старший чабан и его помощник). Первый работает в родильном отделении днем, а второй — ночью. При неправильных родах дежурящий обязан оказать матке помощь. Если, скажем, ягненок идет с завернувшейся головой, надо путем вмешательства исправить рукой такое положение ягненка. При оказании помощи соблюдение чистоты рук является совершенно обязательным. Каждого родившегося ягненка дежурный дает матке облизать, и тут же, перевязав пуповину, отрезает ее, смазывая место отреза иодом. Без смазывания пуповины часто наблюдаются случаи заболеваний ягнят, происходящих через заражение ягненка от пуповины.

Следовательно необходимо каждое родильное отделение снабдить достаточным количеством иода и медикаментами.

6. Подпаивание и подкормка ягнят

При ягнении часты случаи, когда ягненок настолько слаб, что не может сосать матку, либо матка не имеет молока. Если это явление останется вне внимания чабана, ягненок очень скоро погибнет. Поэтому прямой обязанностью бригадира является знать всех своих слабых ягнят и безмолочных маток и оказывать ягнятам помощь путем подпаивания их. Надо слабого ягненка подсадить к соску матери и помочь ему сосать. Ягнятам же от маломолочных маток надо давать коров и молоко из рожка с соском. Подпаивание требует

идеальной чистоты, а именно: молоко должно быть свежим, температурой в 39—40° Ц. (температура тела овцы). Соски и рожки надо мыть кипятком. Если не соблюдать этих правил, можно вызвать у ягнят понюс, а с ним связан и отход их.

Первые дни ягнят подпаивают 4—5 раз в день, давая в один раз 100—200 г молока. В дальнейшем можно ограничиваться 3-кратной выпойкой, даваяют 300 до 500 г.

Наряду с выпойкой ягнят коровьим молоком надо использовать для выпойки ягнят-сирот всех маток, у которых ягната пали или у которых ягната рожутся на смушки. Эти матки, так называемые «мамки», часто не хотят принимать чужого ягненка. Тогда приходится натирать подсаживаемого молоком мамки и садить мамку с ягненком в острог. Через день-два матка примет ягненка и поступит в сакман.

В овцеводческих хозяйствах укоренился стариный вредный способ подсаживать ягненка путем надевания на него шкурки, снятой с павшего. Этот способ надо жестко искоренять, так как он приводит к усилению отхода ягнят.

Теперь о подкормке ягнят. Надо считать обязательным стремиться как можно скорее приучить ягненка есть концентраты. Чем скорее он начнет хорошо есть их, тем более будет обеспечено нормальное развитие молодняка.

Приучать ягненка есть концентраты надо со 2-й декады, причем вести приучение нужно постепенно. Наилучшими кормами в этот момент являются пшеничные отруби и просеянная овсянка. Первые дни дается не более 20 г корма на голову. Через несколько дней дача доходит до 50 г, а в 1½-месячном возрасте можно давать и по 100 г. Очень полезно, если в дачу ягнятам вводится просеянный льняной или подсолнечный жмых. Его можно вводить наполовину с овсом. Жмых как корм, богатый белком, необходим ягнятам, и поэтому надо добывать его в хозяйстве.

При подкормке ягнят должна соблюдаться чистота кормушек и чистота помещения, где ягнята подкармливаются. Подкормка обыкновенно лучше сможет быть организована в 60-маточных сакманах. Для этого надо между станками сакманов устраивать ягнячи «столовые». Эти станки-столовые отгораживаются от маток такими решетками,

что ягненок легко проходит в столо-
вую через решетку, а матка пройти
не сможет. В столовой ставятся ко-
рытца с ювсянкой, с солью и ясли с
лучшим сеном.

Во время пастбищного периода под-
кормку ягнят надо вести на тырлах,
устраивая там по только что описан-
ному способу помещения — столовые.
Нельзя забывать также о даче ягнятам
мела или костяной муки. Целесообраз-
но вмешивать ее в дачи овсянки по
чайной ложечке в день.

7. Пастыба ягнят в сакманах

Принято выгонять ягнят на пастбище
как можно скорее. Там, где весна ран-
няя и устойчивая, такой способ дает
весьма положительные результаты. Но
в районах с холодными веснами, при
неустойчивой погоде выпасное содер-
жание ягнят требует внимательного под-
хода. Необходимо учитывать, что ягната
легко простуживаются и гибнут. По-
этому надо для выпасания ягнят иметь
близко у кошары богатые по траво-
стою пастбища. Скорее всего и лучше
 заводить участки сеянных выпасов у ко-
шар. Они дадут юбильное питание и
в то же время позволяют укрывать в ко-
шаре ягнят от непогоды.

Ни в коем случае нельзя допускать
пастыбы ягнят на пониженных участ-
ках, хотя они и богаче травостоем. На
таких участках можно погубить весь
сакман, заразив его глистами.

При пастыбе надо обращать внима-
ние, чтобы ягната не ели землю. Из-
за недостатка в минеральном питании
ягната при выгоне на пастбище жадно
набрасываются на свеженарытую землю,
наедаются ею и гибнут. Сакманщик,
т. е. пастушок, обязан это твердо пом-
нить и не допускать ягнят к земле.
Но для того чтобы вообще ликвидиро-
вать эту болезнь, надо подмешивать в
корм ягнятам мел или костяную муку,
о чем уже говорилось выше. Сакман-
щик должен также знать все ядовитые
растения на своих участках, чтобы не
допускать к ним ягнят, так как ягната
по неопытности набрасываются на вся-
кую растительность, а наевшись ядо-
витой, — гибнут.

Сакманщик во время пастыбы обязан
наблюдать, сколько раз и как матки
коряят своих ягнят. Часто наблюдается

такая картина: матки, наевшись, мирно
лежат на солнышке, пожевывая жвач-
ку, сакманщик спит, а ягната бегают,
кричат, хотят есть. В данном случае
надо «поднять» маток, т. е. согнать их,
и они сразу же дадут ягнятам сосать.

Таким образом роль сакманщика сов-
сем не такая простая, как полагают
иные. Пока что и в наших социали-
стических хозяйствах наблюдается не-
дооценка сакманщика, а это приводит к
усиленному отходу молодняка. Ведь на
попечении сакманщика фактически на-
ходится группа маток с ягнятами в те-
чение 10—12 часов в сутки! Надо пере-
квалифицировать сакманщика так же,
как и чабана.

8. Организация рабочей силы

Организацию рабочей силы необходи-
мо начинать с проведения курсов по
яннению. Курсы должны быть кратко-
срочными (не больше одной декады).

Перед самым же яннением бригада
распределяет свои силы примерно так:

Бригадир (старший чабан) отвечает за
всю отару. Работает же он в родильном
отделении, принимая ягнят. Ведет учет
и метит ягнят при посадке их в юстроги
и сакманы. Следит за молочностью мат-
ок и активностью ягнят. Подпинает
слабых ягнят. Подсаживает ягнят к
мамкам. Имеет помощника-подростка
или младшего чабана.

Зам. бригадира работает ночью в ро-
дильном отделении и исполняет работу
бригадира в его отсутствие.

Младшие чабаны: 1-й пасет группу
ягнящихся маток вблизи кошары и до-
ставляет в родильное отделение маток,
начинающих янниться. Имеет помощни-
ка-подростка. 2-й пасет всю отару маток
на дальнем участке.

Подростки (сакманщики) пасут груп-
пы маток с ягнятами на ближних выпа-
сах под постоянным контролем брига-
дира или его заместителя. Соревнова-
ние и ударничество — основной метод
в борьбе бригады за выполнение пору-
ченного ей ответственного дела. Сорев-
нующиеся должны драться за полное
сохранение молодняка, за экономию кор-
мов и пастбищ, за рационализацию ра-
боты, за точный учет.