

# ПЕРЕДОВИКИ СОЦ. ЖИВОТНОВОДСТВА

Н. ФИЛЯНСКИЙ

Совхоз № 12 «Большевик»

## «Большевик» РАБОТАЕТ ПО-БОЛЬШЕВИСТСКИ

Поголовье совхоза состоит из местных мериносовых ювец, улучшенных кровью импортных сев.-американских рамбулье.

Таблица 2 (продолжение)

М е с я ц ы										З а г о д		
	VIII		IX		X		XI		XII		Всего голов	Проц. к поголовью
	Гол.	Проц.										
1931	254	0,68	269	0,68	124	0,33	158	0,39	70	0,19	3 252	7,7
1932	135	0,52	88	0,4	81	0,34	44	0,21	31	0,15	2 302	5,62
1933	64	0,23	80	0,27	72	0,25	92	0,33	153	0,6	1 710	5,4

Окот ягнят после окота до конца года характеризуется табл. 3.

Таблица 3

Годы	Наличие ягнят на 1/VI	М е с я ц ы										Всего за период	
		VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Гол.	Проц.	Гол.	Проц.	
1931	16 239	156	0,9	148	0,9	101	0,6	252	1,63	162	0,9	130	0,63
1932	25 002	334	1,86	103**	0,91	94	0,77	72	0,58	88	0,7	68	0,57
I/VI до 1/VII	12 303											29	0,16
1933	13 572	140	1,0	87	0,67	60	0,43	65	0,43	40	0,3	34	0,26
												90	0,7
												516	3,8

\* В начале сентября 1931 г. от Союзмиса было принято 2 332 гол. ягнят, за счет которых и увеличился отход. В этих 2 отарах была проведена оздоровительная работа, ягната пришли в должное состояние и отход в дальнейшем, как показывает таблица, пришел к норме.

\*\* С 1/VII 1932 г. совхозу № 22 было выделено 12 699 гол. ягнят, после чего в совхозе № 12 осталось 12 303 гол. К этому числу и велт в дальнейшем процент отхода.

Как видно из таблиц, работа по сохранению стада дала положительные результаты.

По окоту и снижению яловости совхоз добился следующих показателей:

Таблица 4

Годы	Пошли маток в случку	Из них окотилось	Гол.   Проц.	Осталось яловых	Гол.   Проц.	Родилось жив. ягнит	Гол.   Проц.	Пало ягнят за время окота	Гол.   Проц.	Осталось живых ягнят на конец окота	В процентах к маткам, пошедшим в случку
						Взрослые мериносовые матки					
1931	15 918	14 411	90	1 021	6,6	17 546	121	1 307	7,4	16 239	102
1932	19 723	18 280	93	954	4,8	24 198	133	2 646	10,9	21 552	109
1933	10 556	9 846	93	429	4,0	11 981	123	1 142	9,5	10 839	103
Ярки, слученные в 1½ года											
1931											
1932	4 058	3 791	93	222	5,5	4 125	109	341	8,3	3 784	92
1933	2 826	2 623	93	137	4,8	2 626	100	393	14	2 233	79
По отаре маток с систематической яловостью											
1933	806	510	63	250	31	580	118	85	14	425	76

В 1933 г. в совхозе пошли в окот 806 гол. маток, оставшихся яловыми в 1932 г. Они выбраны из всего маточного

стада в 23 000 гол. При разделе совхозов эти матки, сформированные в отдельную отару, остались в совхозе № 12.

Они оставались яловыми в течение 1931 и 1932 гг. В этой ютаре случка была проведена с особой тщательностью, но, несмотря на это, она дала, как и следовало ожидать, громадный процент яловости — 31%. Из 806 гол. яловыми осталось 250 гол.

Так как эти матки уже в течение 3 лет остаются яловыми, то совершенно очевидно, что из-за имеющихся у них нарушений нормальной работы полового аппарата они вообще не могут давать приплод. Если отнести эти 250 гол. к стаду маток в 23 000 гол., из которых они были выделены, мы получим 1% систематической яловости.

Как видно из табл. 4, из каждого 100 слученных маток в юкот поступают в среднем по совхозу 93 гол.; остальные 7 гол., или процентов, распределяются следующим образом: яловыми остаются 4% и 3% падают на отход за время от случки до конца юкота. В отдельных ютарах процент юкотившихся маток удалось поднять до 95% к слученным. Остальные 5% распределяются следующим образом: 2,5% остаются яловыми и 2,5% составляют отход за время от случки до конца юкота. Добиться в среднем по стаду юкота 95% слученных маток — очередная задача совхоза.

Совершенно неудовлетворителен показатель по отходу ягнят за время юкота. Интересно отметить, что до 1931 г. процент отхода ягнят за время юкота не поднимался выше 6%, в то время как выход ягнят к концу юкота был ниже приведенного (исключая 1930 г.).

Дело в том, что в 1931 г. впервые был введен правильный учет ягнят во время юкота. Он сразу же показал повышение отхода до 7,4%. В 1932 и 1933 гг. учет ягнят был поставлен еще лучше и получено дальнейшее повышение процента павших ягнят при одновременном повышении выхода живых.

На основании непосредственных наблюдений за последние 3 года и имеющихся материалов за предыдущее время можно сделать предположение, что взрослые матки местных мериносов дают даже в такие бедные двойнями годы, как например 1933 г., не менее 20% двоен.

Было бы чрезвычайно ценно, если бы работники хозяйств, которым удалось снизить процент отхода мериносовых ягнят до 3—4, поделились своим опытом и рассказали, каким путем они этого добились.

Полученный нами процент отхода ягнят после юкота (табл. 3) тоже свидетельствует о том, что и в нашем совхозе уход за новорожденными ягнятами поставлен неплохо.

Борьба за снижение отхода ягнят — одно из самых больных мест в работе совхоза и на него должен быть сделан упор.

Интересно сравнить приведенные выше показатели по отходу ягнят, полученные в совхозе, с показателями одного из лучших дореволюционных помещичьих хозяйств на юге России, работавшего тоже с местным мериносом.

Проф. Кулешов приводит средние за 8 лет данные (табл. 5) по ювцеводству барона Штенгеля (бывш. хозяйство «Хуторок»):

Таблица 5

Показатели	Хуторок	Совхоз № 12 1932 г.	1933 г.
Отход взрослых за год в проц. . . . .	9,57	5,6	5,4
Отход ягнят от конца юкота по 1/X в проц. . . . .	7,8	4,12	2,53
Отход ягнят с 1/X по 1/IV в проц. . . . .	4,43	2,04	—

Как видно из этой таблицы, совхоз значительно опередил это передовое капиталистическое хозяйство.

Каким образом совхоз добился таких результатов? Они получены путем ежедневной упорной работы в течение целого ряда лет. Немало способствовал этому и переход совхоза (с осени 1931 г.) на сдельную оплату труда чабанских бригад. В совхозе не на бумаге, а на деле ликвидирована юзелочка. Каждый работник чабанской бригады знает, что оценка его работы, материальное благополучие его и его семьи полностью зависит от его работы по сохранению стада. Он знает, что первая и лучшая пара спечебуви, внимание и уважение всего коллектива всецело зависят от производственных показателей о работы. Чабанский коллектив совхоза «Большевик» — это дружный, спаянный коллектив ударников, обеспечивающих в любую погоду, при любых условиях нормальное, бесперебойное обслуживание стада. Результатами своей работы совхоз прежде всего обязан героической работе чабанского коллектива.

Вторым решающим моментом в работе совхоза по сохранению поголовья является правильная и своевременная борьба с эпизоотиями.

Чесотка в стаде совхоза уже давно отошла в область предания; однако, несмотря на принимаемые профилактические меры, она иногда различными путями проникает в совхоз. Но первые же пораженные ею овцы во время обнаруживаются, болезнь локализируется в начальной стадии — и ликвидируется. Стадо продолжает оставаться здоровым.

В 1931 и 1932 гг. в совхозе появились глисты (ленточные). Особенно много их было в 1933 г. Но первые же их членники были замечены в Кале, на борьбу с ними был мобилизован весь зооветперсонал и чабанские бригады, и глисты исчезли, не причинив стаду вреда.

Гемосептицемия, хотя и не находит широкого распространения в совхозе № 12, но все же исподтишка вырывает из стада по несколько голов. Появившаяся было копытная гниль была быстро ликвидирована. Вертячка тоже постепенно исчезает. Ее отступление характеризуется следующими цифрами:

Таблица 6

Годы	Поголовье ягнят рождения прошлого года, которое преимущественно поражается вертичкой	Отход от вертички	
		(в гол.)	(в проц.)
1930	9 000	492	5,46
1931	15 000	624	4,16
1932	16 000	403	2,50
1933	12 000	172	1,43

Этот успех в борьбе с эпизоотиями объясняется тем, что проведение профилактических и ветеринарных мероприятий является общим делом не только зоотехнического и ветеринарного персонала, но и всего чабанского состава. Обычное недоверие чабанов к ветмероприятиям давно ликвидировано путем соответствующей разъяснительной работы. Кроме того чабан видит своими глазами всю эффективность проводимых мероприятий.

Третий решающий момент — правильное выращивание молодняка, благодаря чему он вырастает в крепкую и стойкую

овцу. А крепкое, выносливое стадо в хорошей упитанности — это основа всех основ.

Инаконец, в-четвертых, мы проводим ежедневный тщательный контроль работы чабанских бригад и состояния стада. Это позволяет во время заметить и устранить такие моменты, которые могут неблагоприятно отразиться на состоянии поголовья, и дает возможность держать стадо в хорошей, ровной упитанности.

Вот эти четыре момента и обеспечили в основном описанные нами результаты работы совхоза.

Конечно в совхозе далеко не все обстоит хорошо и гладко. И у нас еще есть целый ряд существенных недочетов: в зимовку 1934 г. стадо не было удовлетворительно обеспечено грубыми кормами как в отношении качества, так и количества его. План строительства не выполнен, и совхоз вынужден был сформировать громадные отары: маток — по 1 550 гол., а 2 ютары ягнят рождения 1933 г. даже по 1 700 гол., чтобы хоть как-нибудь поместить их на зиму под крышей. Овцеводческого инвентаря у нас совершенно недостаточно. При стаде в 38 000 гол. ясель имеется всего лишь на 9—10 000 гол. Остальные зимуют без ясель, на тырле. Рештаков мы имеем всего 200 на весь совхоз. Мало щитов, кучек, бочек и т. д. К тому же весь имеющийся инвентарь очень низкого качества, все это сметано, как говорится, на «живую нитку». Поэтому в дальнейшем для закрепления и углубления производственных показателей, достигнутых в результате многолетней упорной работы, должны быть произведены необходимые капитальные затраты.

Но, несмотря на все трудности и неполадки, чабанский состав и все работники колхоза дают слово, что упорной ударной работой и большевистской борьбой за каждый килограмм корма и за каждую голову стада эти трудности будут побеждены. И в текущем 1934 г., когда партией в решениях XVII партсъезда и указаниями тов. Сталина поставлена задача быстрейшего разрешения животноводческой проблемы, совхоз «Большевик» еще большим напряжением сил и еще более высокими показателями по воспроизводству стада добьется новых побед.