

Овечьё молоко

А. ЛЮБОВСКИЙ

Хорошо организовать дойку

Три года прошло с тех пор, как наши овцесовхозы, преодолев консервативность, а порой и прямое противодействие со стороны ряда работников овцеводческой совхозной системы, вплотную взялись за использование молочности овец.

В 1933 г. план производства по овцесовхозам был установлен в 3 408 т и выполнен в размере 3 167 т, что составляет 92,9%.

Причина недовыполнения — скверная организация этого дела в ряде трестов и совхозов.

На 1934 г. план производства брынзы по совхозам установлен в 3 200 т. Нет нужды доказывать, что план вполне реален и выполним. Хорошей организацией дойки овец и производства брынзы овцесовхозы дадут стране большое количество высокопитательных белковых продуктов, необходимых для улучшения рабочего снабжения; с большей полнотой используют многообразную продуктивность овец; создадут себе новый, огромный источник оборотных средств, необходимых на расширение производства, и наконец повысят рентабельность грубошерстного овцеводства совхозов.

В прошлом (1933) году наряду с плохой организацией дойки отсутствовал должный контроль за брынзоварными пунктами, в результате чего имело место разбазаривание молока и брынзы. Совхоз «Кабадан», Таджикского овцеводтреста, выполнил план только на 23%, сдал государству всего лишь 11,7 ц и разбазарил внутри совхоза 13 ц. За допущенную бесхозяйственность дирекция совхоза понесла заслуженную кару. В ряде совхозов в дойку пускались матки, от которых отбивались ягнята моложе 3 месяцев, что конечно не замедлило отрицательно сказаться на развитии этих ягнят.

В текущем году дойка маток в овце-

совхозах должна быть организована так, чтобы выполнение обязательств перед государством не отражалось на выполнении плана воспроизводства стада.

Какие матки ставятся в дойку

На дойку поступают все матки смушковых пород (каракуль, малич и др.), ягнята которых забиты на смушек; матки грубошерстные, цыгайские и метисы с шерстью 4-го класса, кроме тех, у которых ягнята остаются на племя (матки романовские дойке не подлежат). Матки-безягнятницы, у которых ягнята во время окота пали от незаразных болезней, поступают в дойку немедленно, а остальные тогда, когда ягнята достигнут 2½-месячного возраста.

Порядок дойки

В первые 3—4 недели дойка производится один раз в сутки — в конце дня. Для этого на ночь ягнята подпускаются к маткам, а с утра отбиваются и пасутся в течение дня отдельно. В зависимости от местных условий, дойку можно производить утром; для этого ягнята днем пасутся вместе с матерями, на ночь же их отбивают. В этом случае необходима пастьба овец ночью. Неплохо, если и в первом случае, пастьба будет производиться ночью. Полная отбивка ягнят производится в возрасте 3½ месяцев, причем в первую очередь отбиваются хорошо развитые ягнята и через 7—10 дней — остальные.

Запрещается ставить на дойку маток: а) больных, б) имеющих 2 и более ягнят, в) маток, у которых больные ягнята, г) маток тех ферм, где обнаружены заболевания ящуром и оспой, впредь до ликвидации этих болезней и выдачи ветнадзором специального разрешения на начало дойки.

За 1½ месяца до начала случки необходимо прекратить дойку, чтобы иметь возможность подготовить маток к случке и не допустить повышенную яловость.

Уход за ягнятами

Ягнят доящихся маток неплохо подкармливать концентратами, — начать с 25 г в день на голову, постепенно увеличивая эту норму до 100 г. Корм следует задавать на ночь в решетах, а если зерновой, то в дробленом виде. Желательно на отару в 500—600 голов ягнят давать в смеси с концормами килограмм косяной муки. Подкормку ягнят косяной мукой производить до 4 месяцев.

Слабых ягнят следует отбирать от маток в возрасте 4 месяцев и держать отдельной отарой, предоставив им лучшие выпасы и усилив дачи концентратов.

Дойным маткам также предоставляют лучшие выпасы. Если же последние недостаточно удовлетворительны, следует практиковать подкормку концормами в количестве 200—250 г на голову в сутки. Эта затрата всегда оправдывается.

Подкормку овец производить лучше утром, перед выгоном на пастбище.

Правила дойки овец

Доение должно быть организовано с таким расчетом, чтобы обеспечить: спокойное состояние овец; выполнение санитарных правил в отношении стада и обслуживающего персонала; правильную технику доения; чистоту и хорошее состояние молока и, главное, хороший рост и развитие ягненка.

Чем спокойнее чувствует себя овца до доения и во время его, тем больше она дает молока и тем легче ее доить. Для этого делается загон с доильным станком (струнгой). Площадь загона определяется из расчета 1 кв. м на каждую пару овец. Загон делается 4-угольный, разделенный пополам перегородкой.

В перегородке делается струнга (доильный станок). Струнга состоит из стоек, образующих дверцы. В эти дверцы овцы проходят из задней в переднюю часть загона. Около дверей сидят дояры на маленьких табуретках и выдают приходящих овец. Размер дверцы делается с расчетом, чтобы прошла только одна овца. При дойке овца удерживается обручем, накинутым на шею. Обруч привязан к одной из стоек.

Над доильным станком устраивается легкий навес.

Санитарные условия

Общее наблюдение за состоянием доящихся маток ведет ветврач, а по отаре —

старший чабан. Он же регулирует пастуху овец на дойку, выявляет больных и отделяет их от здоровых и информирует администрацию фермы и ветперсонал обо всех заболеваниях.

При дойке овцы осматриваются деляром. Дояр обращает внимание на состояние вымени (нет ли мастита), следит за появлением червей, за копытами. В случае обнаружения чего-либо дояр сообщает чабану, а последний должен немедленно принять меры.

Дояры обязаны перед дойкой дочистить обтирать мокрым полотенцем вымя и следить, чтобы у подоенных овец вымя было сухим. В противном случае оно обветрится и будет трескаться. Шерсть на вымени должна быть острижена; чтобы не поцарапать вымени или сосков, дояры не должны иметь больших ногтей. Перед дойкой дояры обязаны мыть руки с мылом, и иметь чистую прозодежду. Загон и струнга должны содержаться в чистоте.

Техника дойки

В совхозе применяется ряд способов дойки. Наиболее практичными оказались из них два.

Молдавский — дойка овец «сзади». Дояр, придерживая левой рукой вымя овцы, правой сдаивает молоко пальцами из сосков, или надавливанием вымени обеими руками выжимает молоко.

Иногда второй вариант дополняется первым, т. е. сдаиванием пальцами. В последнем случае достигается наибольшая чистота дойки.

Дойка сбоку. Загон перегораживается щитом с рядом клеток, с промежутками для мест доярок. Клетка — удлиненной формы и имеет две выдвижные дверки (входную и выходную). Открыв входную дверку, дояр выпускает овцу, после чего дверку закрывает. В боковой удлиненной стенке клетки от пола клетки на высоте в 30—40 см и такой же ширины сделано отверстие, через которое дояр сдаивает приемами дойки коров молоко в подойник, находящийся в ногах дояра.

При первом способе дойки достигается быстрота в работе, зато больше шансов на загрязнение молока калом и мочей доящегося животного. Во избежание этого при дойке овец сзади следует подойник покрывать марлей.

Чистота и хорошее состояние молока имеют решающее значение, ибо они бес-

печивают получение доброкачественного продукта при переработке.

Для этого нужно, чтобы поддоиники были чистыми. При переливании из поддоиника во фляги молоко необходимо процеживать через металлическую сепалку с двойным решетом и ватным фильтром. Молоко по окончании дойки должно немедленно доставляться на брызговарный пункт. Расстояние от места дойки до завода не должно превышать 5 км, иначе возможна порча молока в пути.

Дояр-бригадир должен следить за чистотой посуды, полотенец, прозодежды.

Организация рабочей силы

В вопросах организации рабочей силы на дойке овец каждый совхоз должен исходить из следующих основных положений:

1. Количество рабочих на одном пункте должно быть таким, чтобы обеспечить дойку отары не более чем в 2 часа.
2. Дояры должны быть проинструкти-

рованы, для того, чтобы они неправильной дойкой не вызывали заболеваний вымени.

3. Старший дояр во время дойки должен быть постоянно на доильном пункте и все время контролировать работу дояров и инструктировать их.

4. В совхозах, где установлены заболевания овец бруцеллезом, в обязательном порядке применяется:

а) личная профилактика дояров и обслуживающего персонала, тщательная обмывка вымени перед дойкой и после нее, тщательное мытье рук дояров;

б) в этих совхозах овечье молоко от отар, неблагополучных по бруцеллезу, перед переработкой обязательно пастеризуется при температуре в 65—70° в течение 20—30 минут.

5. Дойка овец производится на основе бригадной сдельщины.

В этом году, правильно организовав дойку, совхозы и ОТФ должны наряду с этим поставить на должную высоту учет и контроль за дойкой и производством брызгов.

Болезни овец и борьба с ними

И. ДВОЕГЛАЗОВ

БЕРЕГИТЕ МОЛОДНЯК

Хорошо проведенная окотная кампания с показателями, определяющими стоцентный и более выход ягнят к плану окота, говорит о честной, умелой работе чабанской бригады. Впереди еще трудная и почетная для бригады задача — сохранить ягнят. Сохранить ягнят к отбивке — это значит выполнить план и победить в социалистическом соревновании. Соревнование — дело высокой чести ударника в овцеводстве, подлинного участника в деле восстановления социалистического животноводства. Наконец сохранение ягнят — это натуральная премия, улучшающая материальный уровень чабанской бригады.

Первые месяцы жизни ягненка — это наиболее уязвимый период его жизни. В первые месяцы ягненок

легче поддается заболеванию и труднее их переносит, а всякое заболевание ослабляет неокрепший организм, задерживает его рост и развитие, вызывает повышенный отход или, в лучшем случае, оставляет массу заморышей, в будущем отары хурды.

Нужно твердо себе усвоить, что предупреждать болезнь легче и дешевле, чем ее лечить.

Особенно это правило применимо в овцеводстве, где проведение массовых лечебных мероприятий нередко связано с потерями. В проведении предупредительных мер ветеринарно-зоотехнический персонал является только руководителем, организатором и контролером.

Повседневная основная работа по охране стада от заболеваний лежит на чабанской бригаде, зависит