

ОПЫТ БОНИТИРОВКИ ЯГНЯТ ПРИ РОЖДЕНИИ

(Шлемхоз «Овецвод» № 3 им. Сталина на Северном Кавказе)

Охарактеризовать экстерьерные и хозяйственно-полезные признаки животного и предопределить его хозяйственное назначение в первые дни его жизни — задача трудная, но вполне разрешимая.

Задача эта вызывается двумя моментами. Во-первых, необходимостью произвести выбраковку животных, не отвечающих по своим качествам установленному стандарту в более раннем возрасте, и этим сократить непроизводительные расходы на выращивание неудовлетворительного племенного материала. Во-вторых, оценка ягнят позволяет судить о племенных достоинствах баранов-производителей и дает возможность своевременного снятия их с племенной службы, если по тем или иным причинам некоторые экземпляры дают неудовлетворительный приплод. Инструкция ВИЖА предусматривает оценку баранов-производителей по приплоду, когда он достигнет годовичного возраста. Согласно этому положению бараны, поставленные на испытание осенью 1933 г., могут быть допущены к дальнейшей племенной службе или забракованы только весной 1935 г. Следовательно в случной сезон текущего года они не могут быть использованы, или, что еще хуже, будут пущены в случку без основательной проверки.

Исходя из приведенных выше положений, оценка животных при рождении приобретает исключительное значение.

Автором настоящей статьи при весеннем окоте 1933 г. были подвергнуты подробному описанию 100 баранчиков породы прекос в 15-дневном возрасте.

Кроме обычно описываемых типа, характера уравненности и половы, величины и общей оценки животного, автором дополнительно были описаны такие признаки, как кожа, ее запас и структура, степень и форма оброслости, экстерьер, и указано хозяйственное значение животного.

В результате такого подробного описания из 100 баранчиков было отнесено:

к типу А	68 голов
» » В	20 »
» » С	12 »

В смысле хозяйственного назначения было отнесено к числу годных для ис-

пользования при чистом разведении 23 гол., для метизации — 66 гол. и совершенно неподных в качестве производителей — 11 гол.

Пороки в экстерьере были отмечены:

Узкий крестец	у 8 голов
Узкая холка	» 9 »
Превысшая спина	» 1 »
Сильный вад	» 2 »
Высоконогость	» 7 »

Выдающиеся стати были отмечены: широкий крестец у 21 гол., широкая холка у 19 гол.

К годовичному возрасту из 100 баранчиков сохранилось 81. Остальные отошли.

Весной текущего года баранчики были тщательно пробонитированы.

После бонитировки полученные данные были сопоставлены с данными бо-



Студенты-практиканты взвешивают ягненка (зональная станция совхоза «Ударник», Тедженского района Туркмении).

Время и возраст бонитировки	Всего пробонитировано	И з в е с т												
		Отнесено к типу			Назначено для			Отмечены пороки				Отмечены выходящие стати		
		А	В	С	Чистого разведки	Метизации	Брак	Узкий крестец	Увая холка	Провисл. спица	Свислый вод	Высоконоготь	Широкий крестец	Широкая холка
Весна 1933 г. — 15 дней	81	55	17	9	21	53	7	8	9	1	2	7	21	19
Весна 1934 г. — 12 мес.	81	56	15	10	20	53	8	6	9	1	2	7	20	17
Данные бонитировки в 12-месячном возрасте, к данным бонитировки в 15-дневном возрасте (в %)	-102	83,23	111	95,23	100	114,2	75	100	100	100	100	95,23	89,5	
Расхождение ± (в %)	+2	-11,77	+11	-4,77	0	+14,2	-25	0	0	0	0	+4,77	-10,5	

нитировки в ягнячем возрасте. Результаты получили следующие¹.

Из приведенной таблицы видно, что расхождения между данными бонитировки в 15-дневном и 12-месячном возрасте совершенно незначительны. Если же принять во внимание, что наибольшее расхождение при бонитировке в 12-месячном возрасте получилось в сторону увеличения брака (14,2%), что чрезвычайно легко поправимо дополнительной выбраковкой в годичном возрасте, то бонитировка в ягнячем возрасте становится не только желательной, но вполне возможной и необходимой. На какие же дополнительные признаки мы обращали внимание при отнесении ягнят к тому или иному типу, к той или иной категории в смысле хозяйственного назначения?

Важнейшим признаком является кожа. Ее запасу и структуре мы придавали исключительное значение. Известно, что настриг шерсти в пределах одной породы, пола и возраста, при одинаковой длине штапеля стоит в прямой зависимости от величины кожного покрова. У крупных животных по сравнению с мелкими при одинаковых пропорциональных запасах кожи он будет всегда больше. У животных одинаковой величины он будет больше там, где запас кожи больше.

Поэтому кожа у ягненка должна быть как можно просторней, с обязательным присутствием нескольких складок на шее, которые с возрастом постепенно исчезают. Совершенно гладкокожие яг-

нята при рождении так же нежелательны, как многоскладочные. Первое чаще всего указывает на переразвитость и вырождение животного, на плохие шерстные качества, второе присуще животным типа В.

Кожа должна быть подвижной, средней тонины. При определении тонины кожи лучшими показателями служат уши, кожа, покрывающая веки, кончик носа, губы. У животных с тонкой кожей эти части сильно просвечивают кровью. Уши к тому же обладают плохой юброслостью.

Величина уха, по нашим наблюдениям, не имеет никакого значения. Мы встречали слишком большие и слишком малые уши у юдного и того же типа животных, ничем не отличающихся по своей продуктивности.

Вторым важным признаком является степень и форма юброслости ягненка. Мериносовный ягненок должен обладать хорошей юброслостью головы, ног и брюха рунной шерстью. Это дает прямые указания на хорошую юброслость взрослого животного. Наоборот, присутствие в ягнячем возрасте на голове и ногах блестящего, кроющего, волоса указывает на плохую юброслость животного.

Форма юброслости указывает, к какому типу отнести того или иного ягненка.

В отношении типа В прямые указания дает наличие обильной складчатости ягнят, в большинстве своем не ограничивающейся шей и переходящей на все тело. Кожные швы в большинстве случаев выражены, достаточно ясно.

¹ Данные приводятся по баранчикам, достигшим годичного возраста.

Животным типа А свойственны в ягнъем возрасте мелкие, плотные, густосидящие цветки, равномерно распределенные по всему телу. Песига, как признак уравниности и грубости шерсти, пробивается на меньшей половине тела. Кожные швы заметны, но не настолько ясны, чтобы можно было видеть цвет кожи.

К типу С относились ягнята с более крупными, менее выраженными, порой почти бесформенными и менее упругими завитками. Кожные швы почти незаметны. Песига в большинстве случаев покрывает большую половину тела.

В смысле экстерьера новорожденный ягненок должен иметь хорошие, округлые формы тела, без каких-либо заметных пороков. Он должен быть хорошо развит, с крепким костяком, с ровным и широким туловищем. Особо должны отмечаться такие пороки, как перехват за лопатками, провислая спина, свильный крестец, который с возрастом не сглаживается.

Желательны некоторая высоконоготность и обязательная широкая постановка ног. Узкая постановка ног указывает на переразвитость, на слабую конституцию животного.

Таковы итоги этого небольшого по объему опыта. В нынешнем году автор подверг подробному описанию 500 голов, надеясь получить более приближенные данные.

Г. КОРЕЙС

ОСВЕЖИТЬ КРОВЬ КАРАКУЛЬСКИХ ОВЕЦ

Старые чарводары издавна практиковали периодический обмен каракульскими производителями. Обмен этот производился как между отдельными чарводарами, так и между районами.

Это мероприятие вполне обеспечивало освежение крови каракульских овец, сопровождавшееся повышением качества каракульского смушка.

Обмен баранами и подбор лучших производителей давали возможность чарводарам получать каракуль высоких сортов.

Ниже мы приводим таблицу сортности каракульских смушек Кассанского района (Узбекистан), являющуюся результатом многолетней работы чарводаров по линии подбора лучших производителей и обмена ими с другими чарводарами.

Но и сейчас, анализируя приведенные данные, а также данные многочисленных наблюдений, можно сделать следующие выводы:

1. Отношение к бонитировке ягнят необходимо изменить в сторону придания ей большого значения и важности. Обязать проводить ее с помощью квалифицированных лиц.

2. Лучшим временем для бонитировки мериносовых ягнят нужно признать двухнедельный возраст, а не при рождении, как это практикуется в настоящее время.

3. Необходимо увеличить число описываемых признаков, включив хотя бы такие важные признаки, как кожа, ее запас и структура, степень и форма оброслости и экстерьера.

4. При бонитировке обязательно указывать хозяйственное назначение животного и в зависимости от этого применять к нему в дальнейшем те или иные условия содержания.

5. Так как метод бонитировки, позволяющий судить о достоинствах того или иного животного по состоянию его в ягнъем возрасте, еще достаточно не апробирован, — вменить в обязанность научно-исследовательской сети провести широкие опыты с тем, чтобы как можно быстрее консолидировать и рекомендовать производству полученные и уже имеющиеся в практике данные.

Таблица 1

Годы	1-й сорт	2-й сорт	3-й сорт	Всего
	(в процентах)			
1928	93,50	5,25	1,25	100,0
1929	95,24	3,90	0,86	100,0

Эта таблица наглядно показывает, каких результатов добились чарводары (95,24% — 1-й сорт). Но успокаиваться на этом нельзя. Нужно идти дальше и до-