

Животным типа А свойственны в ягньем возрасте мелкие, плотные, густосидящие цветки, равномерно распределенные по всему телу. Песига, как признак уравниности и грубости шерсти, пробивается на меньшей половине тела. Кожные швы заметны, но не настолько ясны, чтобы можно было видеть цвет кожи.

К типу С относились ягнята с более крупными, менее выраженными, порой почти бесформенными и менее упругими завитками. Кожные швы почти незаметны. Песига в большинстве случаев покрывает большую половину тела.

В смысле экстерьера новорожденный ягненок должен иметь хорошие, округлые формы тела, без каких-либо заметных пороков. Он должен быть хорошо развит, с крепким костяком, с ровным и широким туловищем. Особо должны отмечаться такие пороки, как перехват за лопатками, провислая спина, свиный крестец, который с возрастом не сглаживается.

Желательны некоторая высоконоготность и обязательная широкая постановка ног. Узкая постановка ног указывает на переразвитость, на слабую конституцию животного.

Таковы итоги этого небольшого по объему опыта. В нынешнем году автор подверг подробному описанию 500 голов, надеясь получить более приближенные данные.

Г. КОРЕЙС

## ОСВЕЖИТЬ КРОВЬ КАРАКУЛЬСКИХ ОВЕЦ

Старые чарводары издавна практиковали периодический обмен каракульскими производителями. Обмен этот производился как между отдельными чарводарами, так и между районами.

Это мероприятие вполне обеспечивало освежение крови каракульских овец, сопровождавшееся повышением качества каракульского смушка.

Обмен баранами и подбор лучших производителей давали возможность чарводарам получать каракуль высоких сортов.

Ниже мы приводим таблицу сортности каракульских смушек Кассанского района (Узбекистан), являющуюся результатом многолетней работы чарводаров по линии подбора лучших производителей и обмена ими с другими чарводарами.

Но и сейчас, анализируя приведенные данные, а также данные многочисленных наблюдений, можно сделать следующие выводы:

1. Отношение к бонитировке ягнят необходимо изменить в сторону придания ей большого значения и важности. Обязать проводить ее с помощью квалифицированных лиц.

2. Лучшим временем для бонитировки мериносовых ягнят нужно признать двухнедельный возраст, а не при рождении, как это практикуется в настоящее время.

3. Необходимо увеличить число описываемых признаков, включив хотя бы такие важные признаки, как кожа, ее запас и структура, степень и форма оброслости и экстерьера.

4. При бонитировке обязательно указывать хозяйственное назначение животного и в зависимости от этого применять к нему в дальнейшем те или иные условия содержания.

5. Так как метод бонитировки, позволяющий судить о достоинствах того или иного животного по состоянию его в ягньем возрасте, еще достаточно не апробирован, — вменить в обязанность научно-исследовательской сети провести широкие опыты с тем, чтобы как можно быстрее консолидировать и рекомендовать производству полученные и уже имеющиеся в практике данные.

Таблица 1

Годы	1-й сорт	2-й сорт	3-й сорт	Всего
	(в процентах)			
1928 . . . . .	93,50	5,25	1,25	100,0
1929 . . . . .	95,24	3,90	0,86	100,0

Эта таблица наглядно показывает, каких результатов добились чарводары (95,24%—1-й сорт). Но успокаиваться на этом нельзя. Нужно идти дальше и до-

биться получения максимума не первого сорта, а высококачественного каракуля.

Качество получаемого нами каракуля еще невысоко и требует к себе со стороны зоотехников самого серьезного внимания.

Племенная ферма колхоза «Кзыл-Ихтисад», Бек-Будинского района, весной 1933 г. дала следующую сортность каракуля (в процентах):

1-й сорт . . . . .	84,3
2-й » . . . . .	10,4
3-й » . . . . .	4,2
Брак . . . . .	1,1
Итого . . . . .	100,0

Качество же смушка по району за этот же год гораздо ниже и не превышает 81%.

Старая система управления животноводством Наркомзема Узбекистана не обеспечила руководства в деле повышения качества получаемого каракуля. Зоотехническая мысль тоже мало работала над этим вопросом. Теперь, когда мы уже готовимся к осенней случной кампании, управление животноводства должно поставить своей задачей проведение ряда мероприятий, обеспечивающих получение высоких сортов каракуля не только в племенных и товарных фермах, но и в колхозах, у колхозников и в единоличном секторе.

Практику чарводаров по обмену производителями необходимо широко развернуть среди товарных ферм и колхозов. Необходимо также практиковать завоз баранов для обмена из других районов.

За последние пять лет обмен производителями почти не практиковался за редкими исключениями. Такое положение дальше совершенно нетерпимо.

Некоторые фермы Бек-Будинского и других районов уже поставили вопрос об обмене производителей. Управление животноводства Наркомзема Узбекистана должно срочно помочь колхозам про-

вести это мероприятие. Но это надо делать при ближайшем участии ветеринара, дабы этот обмен не явился одновременно причиной распространения бруцеллеза и других заболеваний.

Вторым весьма важным мероприятием для повышения качества смушка является подбор баранов по классу или типу и форме завитка. В основу этого подбора должен лечь принцип бонитировки каракульских ягнят, т. е. размер и тип завитка.

Вольной случке, без разбивки на классы, должен быть положен конец.

Нужно организовать классную случку по типу овец, размеру и типу завитка.

В основу классной случки должно быть положено:

1. Искусственное осеменение — для испытания баранов по потомству.

2. Ручная случка — в племенных фермах.

3. Вольная случка с разбивкой овец по типу — араби, ширави, комбар, а также с разбивкой на классы — по величине и типу завитка.

В колхозах и в стадах единоличного пользования можно допустить вольную случку, но с обязательной выбраковкой баранов 2-го и 3-го классов, и лишь в самых редких случаях допускать к покрытию маток производителей 2-го класса.

Эти два мероприятия — обмен производителями и подбор баранов по классу, а также максимальное их использование должны лечь в основу подготовительных работ к случной кампании.

Родственное разведение каракульских овец понижает качество смушка. Поэтому заведующие ОТФ и зоотехники должны в предстоящую случную кампанию избегать родственного разведения, ведущего к вырождению. Нужно освежить кровь каракульских овец путем обмена и подбора производителей по бонитировочным записям.