

Укомплектовать колхозные товарные фермы, обеспечить скот постройками, кормами и хорошими кадрами — вот боевая программа ударников-свинарей

ДВУХКРАТНОЕ КОРМЛЕНИЕ ВМЕСТО ТРЕХКРАТНОГО

При ручном кормлении по определенным нормам трехкратная дача корма для большинства групп свиней вошла как правило в руководство и в практику наших хозяйств. На операцию кормления затрачивается большая часть труда, времени и средств по уходу за свиньями.

В практике американских свиноводов данному вопросу уделяется много внимания и применением самокормушек и уменьшением затрат труда на кормление свиней достигнуты значительные успехи. Однако этот способ дает лишь частичное разрешение вопроса, так как далеко не все корма и не всем группам свиней могут быть скармлиены из самокормушек. Поэтому естественно возникает вопрос, нельзя ли применить для большинства свиней двухкратное кормление вместо трехкратного и тем облегчить и удешевить нормированный ручной способ кормления.

Данный вопрос был подвергнут экспериментальной проверке кафедрой кормления и откорма свиней Московского института Свиноводства в совхозе «Знамя Октября».

Для опытного откорма свиней пищевыми отходами были взяты свиньи различного возраста, веса и упитанности. Свиней кормили два и три раза в день. Результаты оказались следующими:



Совхоз Ачкасово (Московская обл.)
Свинарки одной из ударных бригад по кормлению поросят

№ групп	Наименование групп	Число голов в группе	Живой вес одной головы			
			В июле	В конце сентября	Средний прирост на 1 год. за время опыта	Средний суточный привес одной головы
			В килограммах			
1	Мелкие улучшенные 2-кратные кормления	16	59,7	99,4	39,7	0,57
2	» » 3-кратные кормления	16	60,5	93,6	39,1	0,56
3	Крупные улучшенные 2-кратные кормления	20	95,6	131,6	36,0	0,50
4	» » 3-кратные кормления	20	96,5	129,4	33,0	0,47
5	Крупные не улучшенные 2-кратные кормления	20	90,0	111,8	22,0	0,31
6	» » » 3-кратные кормления	19	95,2	117,0	22,0	0,31

Свиньи поедали ежедневно 12—15 кг отходов. Желудок и пищеварительный тракт, вмещающая такое большое количество корма, хорошо справлялись с ним как при двухкратной, так и при трехкратной даче корма.

Опыт был дополнен постановкой на откорм еще более тяжелых (30—35 кг) и молодых поросят в возрасте 3—4 месяцев. Результат при откорме свиней до веса 50—55 кг оказался таким же. Опыт говорит, что при откорме свиней пищевыми отходами выгодней применять двухкратное кормление.

Желудок среднего веса свиньи вмещает около 7,5 л пищевой массы. Для переваривания в желудке и постепенного проталкивания в кишки обычных дач корма свинье требуется 15—20 часов. Следовательно при двухкратном кормлении желудок не останется пустым перед поступлением в него новой порции корма, и весь пищеварительный тракт может непрерывно выполнять свою роль, так же как и при трехкратном кормлении.

На основании проведенного опыта можно допустить следующий порядок кормления различных групп свиней в условиях зимнего стойлового содержания.

Взрослые свиньи нормальной упитанности, холостые и супоросные, до второй половины беременности могут кормиться сильными и сочными кормами один раз в сутки (вечером). Утром при выгоне их на прогулку необходимо пре-

доставлять им возможность поедать сено из сенокормушек.

Поросята с 3—4-месячного возраста, взрослые матки во второй половине беременности и хряки-производители могут кормиться сильными и сочными кормами два раза в день — утром и вечером. В полдень во время прогулок им также надо предоставлять возможность пользоваться сеном из сенокормушек.

Матки подсосные с высокой молочностью и большими пометами, а также носье отъема от них поросят, для их поправки и поросята после отъема в течение месяца могут кормиться сильными и сочными кормами, три раза в сутки.

Таким образом трехкратное кормление может быть необходимым только для подсосных маток и поросят-отъемышей. Для всех остальных групп свиней вполне может быть применено двухкратное кормление без понижения результатов в привесе и в развитии животных. Это создаст экономию в затрате на труд по кормлению и на оборудование в 25—30%.

Проф. С. Л. Кузьмин

От редакции. Печатаемая статья проф. С. Л. Кузьмина «Двухкратное кормление вместо трехкратного», редакция считает, что данный вопрос представляет большой интерес.

Желательно, чтобы по затронутому вопросу высказались опытно-исследовательские учреждения, совхозы и колхозы.



Коммуна им. Ленина, Кирсановского района, ЦЧО
Внутренний вид маточного свинарника



СТКФ «Вперед», Бобровский район, ЦЧО
Недавно закончилось строительство свинарника на 60 голов при СТКФ «Вперед». Его внутренний вид

наряду со строительством СТКФ перед колхозами выдвинута крупная задача — развернуть массовое товарное свиноводство там, где нет товарных ферм